



Rosa aciphylla.

1793. Rubens pinx.

Supplément de Beauv.

Rosier cuspidé.

Chapuy sculp.

LES ROSES.

31

ROSA ACIPHYLLA.

R. rubra cuneata glabra palmatifida glabra; foliis oblongo-lanceolatis, cuneatis, glaberrimis, serratis, inaequaliter serratis; petalis supra palmatis, subultratis, cuneatis, cuneatis. Rar. Sin. Huc p. Huj. p. Huj. p. Huj. p.

LE ROSIER CUSPIDE.

DESCRIPTION.

Abrusos qui s'élèvent à la hauteur de deux pieds ou deux pieds et demi. Ses branches, droites et rigides, d'un beau-rouge, ont un peu sur le vert, sont armées d'aiguillons cures, recourbés, presque solitaires. Les ramifications qui naissent le long des rameaux principaux, sont courtes, serrées et rapprochées entre eux. Les feuilles se composent de cinq ou de sept folioles glabres, vertes sur leurs deux faces, oblongues-lanceolées, terminées en pointe, inégalement dentées; les deux ou trois plus grandes sont surmontées de glandes sessiles; les plus courtes de glandes pédicellées. Elles sont portées par des pédicelles, souvent privés d'aiguillons, pubescents à leur face supérieure, glabres en-dessous; munis, à leur base, de stipules pointues, crues, pointues, glanduleuses en leur bord. Les fleurs naissent à l'extrémité des petits rameaux. Les pédicelles qui les supportent, triples et très-courts, tantôt solitaires, tantôt réunis par trois ou quatre en une espèce d'ombelle; sont courts, à leur base, de bractées oblongues et aiguës. Le tube du calice est glaberrime et glauc. Les divisions du tube sont pointues au sommet, appendiculées, velues intérieurement comme